

Pulmovital®
N-Acetil-Cisteína 600 mg

Cada sobre contiene:
N-Acetil-cisteína 600 mg
Excipientes c.s.
Granulado para reconstituir

Agente Mucolítico

Indicaciones

Alivio sintomático de las afecciones del tracto respiratorio en los que hay una excesiva producción de moco. La acetilcisteína está indicada como tratamiento coadyuvante en los procesos respiratorios que cursan con hipersecreción mucosa excesiva o espesa, tales como bronquitis aguda y crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema, atelectasia debida a obstrucción mucosa: complicaciones pulmonares de la fibrosis quística y otras patologías relacionadas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad reconocida a la acetilcisteína. Pacientes con úlcera gastroduodenal. Pacientes asmáticos o con insuficiencia respiratoria grave, ya que puede incrementarse la obstrucción de las vías respiratorias.

Advertencias y Precauciones

La eventual presencia de un leve olor sulfúreo no indica alteración del producto, sino que es propia del principio activo. La administración de acetilcisteína aumenta el volumen de secreciones bronquiales líquidas. Si la tos productiva no fuera suficiente para eliminarla, habrá que considerar el establecer una succión mecánica endotraqueal con o sin broncoscopios.

La acetilcisteína atraviesa la placenta.

La excreción de acetilcisteína en leche materna se desconoce, sin embargo debe usarse con precaución.

Reacciones Adversas

Ocasionalmente se han descrito efectos aislados, de carácter leve y transitorio, siendo las más frecuentes las reacciones gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas). Raramente se presentan reacciones de hipersensibilidad, acompañadas de urticaria y broncoespasmos, caso en el que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Posología

Adultos y niños mayores de 7 años: la posología media recomendada es de 200 mg de acetilcisteína por vía oral cada 8 horas (dosis máxima diaria: 600 mg).

Instrucciones de preparación

Vierta el contenido de un sobre en 125 mL (4 onzas) de agua y agite hasta disolver.

Interacciones con otros medicamentos

No se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros medicamentos, aunque se recomienda no asociar la administración de acetilcisteína con antitusivos o con medicamentos que disminuyen las secreciones bronquiales.

Almacenar a una temperatura no superior a los 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Producto Centroamericano hecho en Costa Rica por Chemo Centroamericana, S.A.,
distribuido por Peratri S.R.L.; República Dominicana**