

DIDYX[®] - PJ

Diclofenac Sódico 50 mg
Amoxicilina 500 mg

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

Formula:

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenac Sódico.....	50 mg
Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina Base.....	500 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCION TERAPEUTICA:

En DIDYX - PJ se combinan la destacada acción antiinflamatoria-analgésica de un AINE como es el Diclofenac Sódico, con la acción bactericida de amplio espectro de la Amoxicilina.

INDICACIONES:

Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, genito urinario, de piel y tejidos blandos y odontoestomatológicas en las cuales el agente etiológico sea sensible a la Amoxicilina y el dolor sea el signo dominante del componente inflamatorio.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

Se deberá evaluar la relación riesgo / beneficio en pacientes con antecedentes de alergia general (asma, eczema, urticaria).

Antecedentes de colitis ulcerosa, mononucleosis infecciosa ó disfunción renal.

Úlcera gástrica ó duodenal en actividad. Hemorragia intestinal. Pacientes con discrasias sanguíneas.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Cansancio ó debilidad no habituales, rash cutáneo, urticaria, prurito, diarrea leve, náuseas ó vómitos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Se recomienda tener cuidado en pacientes con antecedentes de anafilaxia frente a las penicilinas.

El uso de penicilina en lactantes y niños puede dar lugar a sensibilización, diarrea, candidiasis y rash cutáneo.

Puede producir inflamación en la boca y glositis.

Usar con precaución en pacientes con afecciones hemorrágicas, tratadas con antiagregantes plaquetarios y bajo tratamiento anticoagulante, ya que el Diclofenac puede inhibir la agregación plaquetaria.

INTERACCIONES:

El uso simultáneo con Allopurinol puede aumentar la incidencia de rash cutáneo, sobre todo en pacientes hiperuricémicos.

Podría aumentar el efecto de los anticoagulantes orales y de la Heparina.

Los siguientes fármacos pueden interferir con el efecto bactericida de las Penicilinas: Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfamidas ó Tetraciclinas. Puede disminuir el efecto de los anticonceptivos orales que contengan estrógenos.

POSOLOGIA:

Un comprimido recubierto vía oral cada 8 horas, ó según criterio médico.

PRESENTACION:

Caja x 80 comprimidos recubiertos.

PRODUCTO MEDICINAL VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conservar a una temperatura menor de 30° C. Protegido de la Luz y Humedad.

Titular y Fabricante Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.

Planta Industrial: Av. España y San Martín - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Dr. Ubaldo Scavone Y. - Reg. N° 793

Distribuido por PERATRI, S.R.L.