

FUSCATA-DA[®]

Azitromicina 500 mg

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

FORMULA:

Cada comprimido recubierto ranurado contiene:

Azitromicina Dihidrato equivalente a Azitromicina Base.....500 mg

Excipientes.....c.s.

ACCION TERAPEUTICA:

FUSCATA-DA es un antibiótico macrólido cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica bacteriana, al combinarse con la sub-unidad ribosómica 50 S, e interferir con la translocación de los péptidos.

Luego de su administración oral, se distribuye ampliamente en los tejidos corporales.

La vida media de FUSCATA-DA, que refleja la deplección desde los tejidos, es de 2 a 4 días, manteniendo una concentración tisular hasta 50 veces mayor que el plasma.

FUSCATA-DA es activo contra gérmenes Gram positivo, incluidos *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *Streptococcus pyogenes* y *S. pneumoniae*. Es excelente su actividad contra *Haemophilus influenzae* y otros gérmenes Gram negativo como *H. parainfluenzae*, *Moraxella*, *Acinetobacter spp.*, *Yersinia spp.*, *Legionella pneumophila*, *Bordetella pertussis*, *Shigella spp.*, *Vibrio cholerae* y *ParaHaemolyticus*, *Plesiomonas shigelloides* y *Pasteurella spp.*

FUSCATA-DA inhibe los anaerobios tales como el *Clostridium perfringens*, con una potencia un poco mayor que la Eritromicina, pero igual a ésta en relación al *Bacteroides fragilis* y otras especies *Bacteroides*.

La actividad in vitro de FUSCATA-DA se ha demostrado contra *Chlamydia trachomatis*, *C. pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Borrelia burgdorferi*, *Ureaplasma urealyticum*, *Gardnerella vaginalis*, *Haemophilus ducreyi* y *Toxoplasma gondii*.

INDICACIONES:

FUSCATA-DA está indicado en las enfermedades infecciosas que estén causadas por microorganismos sensibles a la Azitromicina.

Infecciones del tracto respiratorio superior (sinusitis, faringitis, amigdalitis) e inferior (bronquitis, neumonía, neumonía atípica). Otitis media.

Infecciones de piel y tejidos blandos. Enfermedades de transmisión sexual (uretritis, cervicitis), causadas por *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma*.

CONTRAINDICACIONES:

Antecedentes alérgicos a cualquier antibiótico macrólido.

EFFECTOS ADVERSOS:

Su tolerancia es muy buena, solo 0,3 % de los pacientes han necesitado abandonar el tratamiento por efectos adversos, generalmente leves y/o moderados, y en su mayoría de origen gastrointestinal: diarreas, heces blandas, dolores, cólicos, flatulencia, náuseas y vómitos. No está establecida la relación causal entre la leve y transitoria reducción de los neutrófilos con el uso de este antibiótico macrólido.

POSOLOGIA:

Se recomienda administrar en dosis única diaria, 1 hora antes ó 2 horas después de las comidas.

Adultos: administrar 1 comprimido por día durante 3 a 6 días consecutivos, de acuerdo al cuadro clínico y mejor criterio del facultativo.

Para el tratamiento de la gonorrea y clamidiasis, es suficiente la toma de 1 gramo (2 comprimidos recubierto) en dosis única.

No es necesario un ajuste de dosis en casos de función hepática alterada.

Niños: debido a la exclusiva concentración de FUSCATA-DA suspensión extemporánea (250 mg / 5 ml), permite una dosificación exacta de acuerdo al peso corporal.

La dosis usual es de 0,2 ml/kg/día (10 mg/kg/día) en una sola toma diaria durante 3 a 6 días consecutivos, de acuerdo al cuadro clínico y mejor criterio del facultativo.

PRESENTACION:

Caja x 30 comprimidos recubiertos ranurados.

**PRODUCTO MEDICINAL VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Conservar a una temperatura menor de 30° C. Protegido de la Luz y Humedad.

Titular y Fabricante Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.

Planta Industrial: Av. España y San Martín - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Dr. Ubaldo Scavone Y. - Reg. N° 793

Distribuido por PERATRI, S.R.L.