

TRINAX®

DICLOFENAC SODICO - VITAMINA B1 VITAMINA B6 - VITAMINA B12 LIDOCAINA

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

SOLUCION INYECTABLE
VIA DE ADMINISTRACION: I.M.

FORMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenac Sódico.....	50 mg
Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato).....	50 mg
Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato).....	50 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	5 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada ampolla A x 3 ml contiene:

Diclofenac Sódico.....	75 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada ampolla B x 1 ml contiene:

Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato).....	100 mg
Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato).....	100 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	10 mg
Lidocaina Clorhidrato.....	10 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCION TERAPEUTICA:

Antiinflamatorio. Antineurítico.

INDICACIONES:

Está indicado en procesos dolorosos agudos y crónicos como polineuritis de cualquier etiología, alcoholismo crónico anemia megaloblastica, neuralgias, regímenes carenciales. Antiinflamatorio - Antirreumático no esteroide con intensa acción analgésica y antipirética. Utilizado en procesos inflamatorios postraumáticos, reumatismo extra articular, infecciones dolorosas e inflamatorias de garganta , nariz, oído. Procesos dolorosos o inflamatorios en ginecología, anexitis, dismenorrea primaria. Estados dolorosos postoperatorios

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los principios activos. Úlcera gastroduodenal.

REACCIONES ADVERSAS:

Los comprimidos ocasionalmente pueden producir trastornos digestivos leves, leucopenia, fatiga, insomnio, irritabilidad, aumento transitorio de las transaminasas y exantema alérgico. Por vía intramuscular puede producir raramente dolor en el sitio y acoloramiento facial pasajero.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas, alergia a la vitamina B1, insuficiencia hepática o renal. En embarazadas utilizar con precaución luego del primer trimestre. No está indicado en niños menores de seis años.

INTERACCIONES:

Administrado en forma simultánea con preparados de litio o digoxina, puede elevar el nivel plasmático de estos. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. Se ha descrito que el peligro de hemorragias aumenta durante el empleo combinado de Diclofenac y anticoagulantes. Puede aumentar la concentración sanguínea del Metotrexato y elevar su toxicidad. La nefrotoxicidad de la Ciclosporina puede ser mayor mediante los efectos antiinflamatorios no esteroides del Diclofenac sobre las prostaglandinas renales. La Vitamina B6 puede acelerar el metabolismo de la Levodopa.

Interactúa con la Hidralazina, Cicloserina, Penicilamina, anticonceptivos orales. Disminuye los niveles de Fenobarbital.

POSOLOGIA:

Vía oral: en adultos la dosis media es de 2 a 3 comprimidos recubiertos diarios con las comidas. En pacientes ancianos, es conveniente no superar los 100 mg diarios (2 comprimidos recubiertos) de Diclofenac.

Vía intramuscular: 1 ampolla A + 1 ampolla B cada 12 a 24 horas.

Mezclar los componentes de la ampolla A + la ampolla B en la jeringa.

PRESENTACION:

Caja x 100 comprimidos recubiertos.

Solución Inyectable: Caja x 1 ampolla A x 3 ml + 1 ampolla B x 1 ml

PRODUCTO MEDICINAL VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conservar a una temperatura menor de 30° C. Protegido de la Luz y Humedad.

Titular y Fabricante Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.

Planta Industrial: Av. España y San Martín - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Dr. Ubaldo Scavone Y. - Reg. N° 793

Distribuido por PERATRI, S.R.L.